

Effetti collaterali, controindicazioni e reazioni

Effetti collaterali comuni consistono in reazioni locali, come dolore, eritema, gonfiore nel sito di iniezione. Reazioni generali comuni includono malessere generale, febbre, mialgie. Reazioni più gravi sono estremamente rare.

Gli effetti collaterali del vaccino sono lievi rispetto ai rischi derivanti dall'influenza.

Il sistema di farmacovigilanza dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) monitora costantemente eventuali eventi avversi osservati in soggetti vaccinati.

Una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, costituisce una controindicazione temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a guarigione avvenuta.

La presenza di eventuali controindicazioni va valutata con il medico.

*Il vaccino antinfluenzale non
può in nessun caso provocare
l'influenza*

Per le donne in gravidanza sono state programmate quattro giornate dedicate con accesso libero alla vaccinazione antinfluenzale, dalle ore 14.30 alle 17.00:

Martedì 22/11/22 - Ravenna
Ambulatorio vaccinale Igiene Pubblica
CMP - v. Fiume Abbandonato, 134 - 2° p.

Giovedì 24/11/22 - Cervia
Ambulatorio vaccinale Igiene Pubblica
via Ospedale, 17

Giovedì 24/11/22 - Lugo
Ambulatorio vaccinale Igiene Pubblica
viale Masi, 20

Martedì 22/11/22 - Faenza
Ambulatorio vaccinale Igiene Pubblica
via Zaccagnini, 22



Inoltre è possibile accedere direttamente agli ambulatori dell'Igiene Pubblica nei seguenti giorni ed orari:

Ravenna (dal 3/11 al 1/12) - il giovedì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Cervia (dal 8/11 al 29/11) - il martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lugo (a partire dal 3/11) - il giovedì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Faenza (a partire dal 8/11) - il martedì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Campagna antinfluenzale 2022-2023
negli Ambulatori dei Medici di Medicina Generale
e negli Ambulatori vaccinali dell'Igiene Pubblica

*Senza influenza,
si può!*

Proteggi la tua salute
e quella del tuo bambino
vaccinandoti contro l'influenza



Immagine da Freepik

Vaccinazione antinfluenzale: un'opportunità per la tua salute

Durante la gravidanza il sistema immunitario è naturalmente indebolito per accogliere al meglio il bambino e portare a termine la gravidanza. Questo però rende le donne gravide più vulnerabili ad alcune infezioni.

Una donna incinta che si ammala di influenza è più a rischio di manifestare forme gravi di malattia che richiedono il ricovero in ospedale.

L'influenza in gravidanza è **pericolosa anche per il bambino** e può portare a parto prematuro, basso peso alla nascita o morte del bambino nelle prime settimane di vita.

La vaccinazione antinfluenzale è la miglior strategia per difendersi efficacemente dai virus influenzali. Inoltre, attraverso il passaggio di anticorpi dalla mamma al bambino anche il neonato nei primi mesi di vita potrà essere protetto dall'influenza e dalle sue complicanze.

La vaccinazione antinfluenzale è **raccomandata** e **offerta gratuitamente** alle donne che all'inizio della stagione influenzale si trovano **in qualsiasi trimestre della gravidanza**, per **proteggere** la mamma e il neonato dalle forme gravi di influenza e **prevenire complicanze per la mamma e la gravidanza** (parto prematuro, basso peso alla nascita, morte del feto).

Il vaccino deve essere ripetuto ad ogni gravidanza.

Familiari e contatti delle donne in gravidanza possono vaccinarsi gratuitamente, presso il loro MMG oppure negli ambulatori vaccinali dell'igiene pubblica, indipendentemente dal fatto che la donna in gravidanza sia stata o meno vaccinata.

Nel corso della gravidanza è **raccomandata la vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse (dTpa)**, da effettuare ad ogni gravidanza, anche se la donna sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali o abbia avuto la pertosse. Infatti, **la pertosse contratta dal neonato nei primi mesi di vita può essere molto grave** o persino mortale e la fonte di infezione è frequentemente la madre.

Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è dalla 27^a alla 36^a settimana di gestazione, idealmente intorno alla **28^a settimana**, al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare.

Il vaccino dTpa si è dimostrato **sicuro sia per la donna in gravidanza sia per il feto**.

La vaccinazione in gravidanza è sicura e raccomandata